


新喜國際企業股份有限公司

New Chemical & Pharm. Co., Ltd

since 1970

cGMP 綜合藥廠 (中藥 西藥 食品 化妝品)



+



+



初期

新生化學工業股份有限公司 (地址：台北縣中和市景新街140號)

開創於1970年1月，由趙遲熊及許華藥師創辦，主要業務：供應軍方及公立醫院，後來加入台大前輩吳祖文、陳寬墀等藥師後，開始開業醫之業務，1976年3月由省議員 蔡陳翠蓮藥師 參予共同經營，使企業茁壯。

成長

1982年5月由 林春雄藥師 接任，並遷至風景優雅之現址，並改名為「**新喜化學製藥股份有限公司**」。

民國77年8月通過GMP。

茁壯

1997年通過針劑第一階段c GMP。

1998年7月因增設食品廠改名「**新喜國際企業股份有限公司**」。

1999年增設化粧品廠。

2001年11月一般製劑通過c GMP第一階段，並獲得表揚。

2003年6月一般製劑通過c GMP第二階段。

2003年11月通過中藥GMP硬體查廠。

2004年2月25日通過中藥GMP軟體查廠。

2005年5月通過西藥c GMP第三階段。

融合

接受華孚、北進、中日、勸奉堂、協興、鹿王等委託代工及配合工研院及各大學等研究機構，參與研發；

秉著不斷學習及維持高品質之精神，吸收各方精華，共創商機。

A. 寧神劑 TRANQUILIZERS SEDATIVE.....	1-2
B. 解熱鎮痛劑 ANTIPYRITICS ANALGESICS	3-7
C. 骨骼肌鬆弛劑 ANTISPASMODICS	8
D. 鎮咳祛痰止喘劑 Antitussives Expectorants Remedies For Asthma...	9-10
E. 抗組織胺劑 Antihistamine Agent	11
F. 自主神經 Autonomatics Agent	12
G. 強心利尿降血壓劑 Cardio tonics Diuretics Hypertensive	13-14
H. 制酸消化劑 Antacids Digestant	15-16
I. 止瀉劑 及 瀉劑 Antidiarrheal and Cathartic Agent.....	17
J. 皮膚劑 Dramatic Agent.....	18-21
K. 磺胺劑消炎劑 Sulfonamides Antimicrobial Agents	22-23
L. 子宮收縮及止血劑 Uterine contraction and hemostat M. 維生素Vitamines.....	24
N.痔疾 Hemorrhoids O.驅蟲劑Anthelmintic Agent	25
P. 賀爾蒙 Hormones.....	26
Q 肝臟營養解毒劑Liver Nutrition Antidote.....	27

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
JT-07	旅樂錠 Trave Lec Tablets (Bronamine)	Melizine HCl Chlorpheniramine Maleate Pyridoxine HCL Caffeine anhydrate	12.5mg 1mg 2.5mg 10mg	A035153100	(P)100T 1000T	暈車、暈船、 動暈、暈飛機。	成人：一日一次二錠 5-7歲：一日一次半錠 <u>預防動暈者前30分鐘 服用</u>	處方
NT-21	平安錠 Penan Tablets (Dramamine)	Dimenhydrinate	50mg	A020701100	(P)100T 1000T	暈車、暈船、暈飛 機、動暈、噁心、 嘔吐、耳鳴及昏眩 症狀。	每次1-2錠 一日3-4次	指示
LT-22	途勞靜錠 Travezin Tablets (Bonamine)	Meclizine HCl	25mg	N004959100	(P)100T 1000T	暈車、暈船、動 暈、噁心、嘔吐、 耳鳴及昏眩症狀。	成人：一日一次二錠	處方
NT-24	神寧錠 Thinin Tablets (Meleril)	Thioridazine HCL	50mg	N009541100	1000T	小兒夜尿、夜驚 症。	一日10-30mg,1-3次 服用； 精神症狀者：1天30- 800mg	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
JC-07	福樂靜膠囊 Trirazine Capsules (Stelazin)	Trifluoperazine 2HCL Phenothiazine 藥類中 較強之抗精神病藥	2mg	A035165100	1000C	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性之行為障礙。 精神分裂症、噁心、嘔吐個性緊張症、焦慮煩躁、不安等症。 ※具強力鎮靜效果,作用迅速且藥效強,其他療法無效之病例,本品常能奏效,可改善精神病患之思想與行為之崩潰現象。	精神分裂症：一天2次，一次2-5mg，漸次增量，最適維持量一天15-20mg,一天最大量30mg 一般止吐、制暈及緊張等：一天1-2次，一次1mg。 <u>全國獨有之膠囊劑型</u>	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NC-01	亞士膠囊 Asu Capsules (Soma)	Acetaminophen Chlorzoxazone Caffeine, anhydrous Thiamine propyldi- sulfide	250mg 150mg 20mg 10mg	A023973100	(P)100C 1000C	關節痛、肌肉 痛、捻拙打撲及 其他肌肉之痙 攣、強直、疼 痛。	每次1粒， 一日三次，飯後服 用	處方
NT-01	壓痛錠 Aton Tablets (Panadol)	Acetaminophen	500mg	A023954100	(P)100T 1000T	解熱鎮痛劑，非 pyrine類製劑，副 作用少。	每四小時1粒	指示
NT-06	勿痛顆粒 (Buceton Granule)	Salicylamide Acetaminophen Caffeine Anhydrous Chlorpheniramine Maleate	270mg 150mg 30mg 2.5mg	A021206172 A021206155	100gm 450gm	感冒諸症狀(鼻 塞、流鼻水、發 熱、頭痛、打噴 嚏)之緩解。	通常一日二次，一 次量 2-4歲 1/6gm, 5-8歲 1/3gm, 9-12歲 1/2gm, 15歲以上 1gm	處方
NT-07	休痛能錠 Cetonin Tablets (Butylon)	Ethenzamide Bucetin Caffeine Anhydrous Thiamine	130mg 130mg 20mg 3mg	A021058100	100T 1000T	肌肉痛、解熱、 鎮痛。 (頭痛、牙痛、神 經痛、風濕痛、 關節痛及月經痛 之舒緩)	一回量8-14歲-1 錠， 15歲以上2錠， 一日三回，飯後服 用	指示
				3				

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NS-03	感冒糖衣錠 Commo S.C. Tablets	N-Acetyl-p-Aminophenol DI-methylephedrine HCL Chlorpheniramine Maleate Dextromethrphan HBR Caffeine Anhydrous Ethoxybenzamide	100mg 4mg 1.25mg 5mg 15mg 83mg	A016367100	1000T	感冒諸症狀 (鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、嗜痰、發熱、頭痛) 之緩解。	一日三次， 一回2錠，飯後服用	指示
NT-12	益可達咖啡因錠 Ergolar Caffeine Tablets	Ergotamine Tartrate Caffeine	1mg 100mg	N000307100	1000T	偏頭痛、過敏性頭痛。	每日2錠， 最少量每日6錠	處方
NC-06	感寧膠囊 Ganin Capsules	Acetaminophen Ethoxybenzamide Dextromethorphan HCl DI-Methylephedrine HCl Chlorpheniramine Meleate Caffeine anhydrous	200mg 166mg 10mg 8mg 2.5mg 30mg	A027330100	(P)100C 1000C	感冒諸症狀之緩解。 (同Colfon,但 Medicon含量多一倍)	一日三次， 一回1錠，飯後服用	指示
LC-01	安妥清膠囊 Antochin Capsules (Indocid)	Indomethacin	25mg	N016925100	1000C	慢性關節炎、關節強直性脊髓炎及手術後外傷疼痛(本品急速緩解疼痛，腫脹壓痛等之炎症症狀及改善運動機能)	一日一至三次，每次一粒	處方



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NC-07	每非那膠囊 Mefenamic Acid Capsules (Ponstan)	Mefenamic Acid	250mg	A013405100	1000C	末梢性抗炎作用、 中樞性之解熱鎮痛 作用。為非麻醉 性，易於耐受具抗 炎性鎮痛劑。手 術後及外傷後之炎 症及腫脹之舒緩， 臨床上之各種疼 痛，均有其效。	成人每次一錠，每日三 次，兒童每次6.5mg/kg 每6-8小時一次；勿超過 7天	處方
NC-08	美樂膠囊 Mero Capsules (Keto)	Ketoprofen	50mg	A023969100	100T 1000T	新型非類固醇類之 消炎止痛劑 緩解類風濕性關節 炎及骨關節炎的症 狀、輕度至中度疼 痛與原發性痛經。	類風濕性關節炎及骨關 節炎：每日 150- 300mg 分 3-4 次服用。 每日最高劑量 300mg。 老年人或腎功能不全病 人的初劑量應降低 1/2- 1/3。輕度至中度疼痛及 原發性痛經：需要時25- 50mg q6-8h，每日最 高劑量 300mg。有肝臟 或腎臟疾病的人應降低 劑量。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NT-18	愛克炎錠 Naproxen Tablets	Naproxen	250mg	A026090100	1000T	類風濕性關節炎、骨關節炎、緩解輕度至中度疼痛、原發性痛經、關節黏連性脊椎炎、肌腱炎、滑囊炎、急性痛風、青少年型類風濕性關節炎、腰痛、急性上呼吸炎症等消炎、鎮痛、解熱。	每日最高劑量 1.25g。 ·類風濕性關節炎、骨關節炎及關節黏連性脊椎炎：劑量因人而異。250-500mg bid。 ·輕度至中度疼痛、原發性痛經、肌腱炎與滑囊炎：初劑量 500mg，此後250mg q6-8h。 ·急性痛風：初劑量 750mg，此後250mg q8h 直到急性發作解除。 ·青少年型類風濕性關節炎：每日約 10mg/kg，分 2 次服用。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NC-09	僻痛膠囊 Piton Cap. (Feldene)	Piroxicam	10mg	A026491100	1000C	※類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：急性新型非類固醇之消炎止痛劑	初劑量每天20mg一次，部分病患可視情形減少到每日10mg	處方
NL-02	感冒液 Cold Solution (同國安感冒液)	N-Acetyl-p-Aminophenol DI-methylephedrine HCL Chlorpheniramine Maleate Dextromethrphan HBR GGE	5mg 0.15mg 0.04mg 0.25mg 1.333mg	A021251157 A021251172 A021251118	60cc 90cc 120c.c. 450c.c. Gal	感冒諸症狀之緩解。	每次30ml，一日三次，小兒用量減半	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NC-15	醫痛膠囊 ITON Capsule	Ibuprofen	200mg	A016674100	(P)100C 1000C	下列疾患及症狀之消炎： 慢性關節婁麻質絲、 關節痛及關節炎神經 痛及神經炎、腰背 痛、手術及外傷後之 消炎、陣痛	成人一日三粒， 分三次服用	處方
LT18	利樂筋錠 Relaxin Tablets (Solaxin)	Chlorzoxazone	200mg	N00491700	1000T	肌炎、腱炎、結合纖 炎、顏面神經痙攣、 神經痛、打撲挫傷、 腰背痛、肌肉痙攣、 肌肉強直	成人每次1~2 錠，一天3~4 次，孩童酌減， 飯後及就寢前服 用， 尊醫師處方使 用。	處方
LT21	透筋鬆錠 Trankinson Tablets (Trancopal)	Chlormezanone	100mg	N005438100	1000T	腰、頸、肩、頭、胸痛、 肌炎、坐骨神經 痛、肌肉性疼痛	成人每次1~2片 一日3次，孩童 酌減，尊醫師處 方使用。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NL-01	咳立平糖漿 Codepin Solution	1cc含 Codeine phosphate Guaiphenesin	0.6mg 10mg	A021776157 A021776118	120cc Gal	鎮咳、祛痰、 (支氣管炎、感冒、咽喉炎、喉頭炎等所引起之咳嗽及喀痰)。	通常一日三次，一次量成人10ml，小孩減量。	處方
NT-20	諾克片 Nocou Tablets 30mg	Carbetapentane Citrate	30mg	N01753100	1000T	急性咳嗽，慢性咳嗽，局部刺激所引起之咳嗽。	每次一片每日3~4次兒童減半。	處方
NL-03	咳恩液 Coughon Solution	10cc 含 DL-methylephedrine HCL Diphenhydramine HCL Amonium Chloride GGE	15mg 15mg 150mg 20mg	N007420157 N007420172	120c.c 450c.c	傷風咳嗽、過敏性咳嗽、百日咳、氣喘、氣管支炎。	成人每次10~20 cc。一日3~4次	指示
NT-11	抑咳錠 Eacoug Tablets 20mg (Resplen)	Eprazinone HCL	20mg	A026280100	(P)100T 1000T	鎮咳祛痰。	一日量60~90mg分三次服用。	處方
NL-04	寧咳液 Lin cough Liq (含Opium)	每1000cc含 Antimony Pot Tartrate Sp. Ethylnitrate Comphorate Opium Tr Ext Glycyrrhiza Liq	0.24gm 30cc 120cc 120cc	A023926155 A023926172 A023926118	100c.c. 450c.c. Gal	咳嗽。	每次2cc~10cc一日三次。	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NT-19	能鼻通錠 Nasalcon Tablets (Rontec)	Carbinoxamine Maleate Pseudoephedrine HCL	4mg 60mg	A027060100	(P)28T 1000T	季節性過敏鼻炎和 血管舒縮性鼻炎所 引起諸症狀之緩 解。	每次一錠，一日4 次。	處方
LT-10	止咳錠 Jyyko Tablets (Medicon)	Dextromethorphan HBr	30mg	A020904100	1000T	鎮咳(感冒、咽頭 炎、支氣管炎所引 起之咳嗽)。	通常成人一次1錠， 一日服用3次，兒童 依年齡遞減。	處方
JT-05	舒妙達錠 Salbutan Tablets (Ventolin)	Salbutamol	4mg	A035146100	1000T	擴張支氣管，而對 心血管無不良影 響，15分鐘後立生 效。	1天3~4次，1次 2~4mg。	處方
HT-03	必疏痰錠 Bisiton Tablets (Bisolvon)	Bromhexine HCL	8mg	A021716100	(P)100T 1000T	急慢性支氣管炎、 手術後等導致之喀 痰困難症。	一日3次，每次1 錠。	指示
NT-25	痛咳平錠 Toncopin Tablets	Codeine Phosphate Acetaminophen	6mg 300mg	A021484100	1000T	關節炎及風濕痛所 引起之筋肉痛、神 經痛、由感冒引起 之咳嗽、解熱、月 經痛。	通常成人每四小時 服一錠，一日三 次。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NS-08	止敏糖衣錠 Zimin S.C. Tablets	Chlorcyclizine HCL	50mg	A023981100	1000T	抗組織胺作用。 過敏性鼻炎、濕疹、皮膚炎及滲出性皮膚炎	一天1次 每次1~2錠。	指示
JT-03	長趨敏錠 Longimin Tablets (Longifene)	Buclizine HCL	50mg	A035164100	1000T	過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、麻疹、過敏性氣喘、食物或藥物過敏、美尼攸噁心、嘔吐及暈船、車、飛機之預防。	通常成人每次1錠，視病情需要可增至每日2~3錠，於晚上服用更方便，或為防止暈車、船、飛機時於出發前卅分鐘至1小時服用。	處方
NS-04	敏糖衣錠 MIN S.C. Tablets (Orotoretin)	Chlorpheniramine Maleate Glycyrrhizin Orotic acid	5mg 50mg 30mg	A05089100	(P)100T 1000T	濕疹、蕁麻疹、皮膚搔癢、支氣管性氣喘、血清症、藥物過敏、鼻塞、流鼻水、昆蟲刺咬。	成人每次1片，每日2~3次。兒童依年齡及症狀遞減劑量。	指示

F

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NS-06	斯可寧糖衣錠 Sconin S.C. Tablets (Buscopan)	Buscopan	10mg	N007626100	1000T	伴有胃腸管痙攣之疾患 (胃痛、食道、胃幽門、十二指腸之痙攣、胃十二指腸潰瘍性及痙攣性大腸炎) 伴有膽管、膽囊痙攣之疾患 (膽囊炎、膽石症之痙攣)。	每次1錠 每日數次。	處方

G

NT-02	壓作錠 Azol Tablets (Diamox) 台大等各大型醫院	Acetazolamide	250mg	A023932100	100T 1000T	水腫、癩病、青光眼。	1天 375~1000mg。	處方
NT-09	信寧錠 Chinin Tablets (Stugeron)	Cinnarizine	25mg	A012552100	100T 1000T	改善腦動脈硬化症及其所引起之障礙。中風後遺症及頭部損傷遺症及改善冠狀動脈硬化症。	一日3次，每次一錠。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
LT-09	利壓腫錠 Hydrochlorothiazide Tablets	Hydrochlorothiazide	25mg	N005874100	1000T	腎性浮腫，肝性浮腫，妊娠浮腫，本態性高血壓，惡性高血壓等症。	浮腫：成人1日1~2次每次1~2片。高血壓：成人一日3次每次1片。	處方
NS-07	三降壓糖衣錠 Triapres S.C.Tablets (Esidri)	Reserpine Hydrochlorothiazide Hydralazine HCL	0.1mg 10mg 10mg	A012000100	(P)100T 1000T	含3種有效成分複合降血壓利反劑，各藥成分具有相當效果。特發性高血壓、腎性高血壓。	特發性高血壓、腎性高血壓一日3~6錠，分2~3次服用。	處方
LT-15	博能錠 Pranolol Tablets (Inderal)	Propranolol HCL	40mg	A022259100	1000T	狹心症、心律不整，對甲狀腺機能亢進之不整脈有效。	成人一次服用，10~40mg，一日3~4次服用，逐漸增至每日三次每次40mg。	處方
LT-08	血氣新錠 Hexin Tablets (Hexanicit)	Inositolhexanicotinate	200mg	N004963100	1000T	器官性機能性末稍血管障礙 (血管閉塞性脈管炎，閉塞性動脈硬化症，凍傷，手足寒冷感、麻痺。)	通常成人一次2錠，一日服用3次一日量可增至16~20錠。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
LC-04	脈速朗膠囊 Vesselon Capsules (Capilan)	Cyclandelate	100mg	A001045100	1000C	腦循環，末梢循環改善，(腦溢血及其後遺症，雷諾氏，四肢麻痺，腦動脈硬化症之改善)。	重者一日6~9Cap 分3~4次輕者一日3~4Cap。	處方
JC-02	優朗膠囊 Eulon Capsules (Hijuven)	dl-a-tocopherol Nicotinamide	100mg	A035154100	100C 1000C	腦中風、高血壓、動脈硬化、冠動脈不全等之脂質代謝。異常，末梢血管障害引起之諸症狀。	通常成人一日3~6次，分3次服用。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NT-08	喜美胃錠 Cimewet Tablets (Tagamet)	Cimetidine	200mg	A024077100	1000T	消化性潰瘍(再發性潰瘍(200mg)、十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍)消化性食道炎。	成人1天5錠(200mg),早午晚三餐各1錠,睡前2錠。	處方
NT-15	瑪果佳錠 Magocaine Tablets (Strocaine) (省聯標)	Oxethazine Aluminum Slicate	5mg 100mg	A025091100	(P)100T 1000T	急慢性胃炎、胃痛、胃不快感。	成人每次2錠,一天3~4次。	指示
NC-12	酵素膠囊 Trizymase Tablets (軍公)	Diastase Pancreatin Pepsin	120mg 120mg 60mg		100C 1000C	消化不良,食慾不振。 飯後使用。	每次1~2粒,每天3粒飯後使用。	處方
NT-22	保力胃錠 Polywe Tablets (Polyorol) (軍公)	Dimethicone Al. hydroxide - Mag. Carbonate co-gel Magnesium Hydroxide	25mg 275mg 100mg	A026809100	(P)100T 1000T	消化不良、胃腸脹氣、胃酸過多、空氣嚥下症、X光線攝影時氣體驅除。	1日3次,每次1~2錠,再三餐之間每日睡前服用。	指示
JC-06	速補潰膠囊 Sulpidin Capsules (Dogmatyl)	Sulpride	50mg	A035163100	1000T	胃、十二指腸潰瘍、燒灼性潰瘍。	通常成人一次1粒,一日3次。服用憂鬱病人成人一天150~300mg分次服用,精神分裂症成人一天300~600mg分次服用。	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
CT21	治潰錠 Zukei Tablets (Tagamet)	Cimetidine	400mg	A031315100	1000T	十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消失性食道炎、上腸胃引起之出血、再發性潰瘍、穿孔性潰瘍。	成人十二指腸潰瘍—活動性潰瘍：一天四次，每次300mg。預防潰瘍復發：睡前400mg。病理性分泌過多疾患—每天四次，每次300mg。孩童一天四次，每次5~10mg/kg。	處方
JT-01	喜胃定錠 Ciwetin Tablets (Tagamet)	Cimetidine	300mg	A035159100	(P)100T 1000T	消化性潰瘍(再發性胃潰瘍、十二指腸潰瘍)消化性食道炎。	同上	處方
NT-27	胃而治錠 Welandyl Tablets (Kolangel)	Dicyclomine HCL Dried Aluminum Hydroxide Gel Mag. Oxide	5mg 400mg 200mg	N000544100	(P)100T 1000T	胃酸過多、胃炎、胃痛、腹痛、胃潰瘍、十二指腸潰瘍。	每次1片每日三次。	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NT-05	必斯錠 Bis Tablets	Bismuth Sub carbonate	324mg	A023936100	1000T	腹瀉、胃痛、胃潰瘍等。	每次2片，每日2~3次。	處方
HT-04	秘暢腸溶錠 Biton E.C.T. (Dulcolax)	Bisacodyl	5mg	A021561100	(P)100T 1000T	便秘。	每次2粒服吞，1日1~3次服用。	處方
JC-03	露培明膠囊	Loperamide HCl	2mg	A035145100	(P)100C 1000C	急慢性腹瀉。	成人每次初量二粒，然後一粒小孩每公斤初量0.08mg然後0.04mg每天2次。	處方



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NE-04	婦寧濃縮液 Fulnin Liq	每cc 含 Lactic acid	0.125ml	A019202555 A019202577	100cc 500cc Gal 6Gal	婦女陰道及陰部之除臭及清潔。白帶之預防與治療。	每次取本劑20ml以溫開水沖泡至400ml直接洗滌陰部。	指示
NO-01	安西拿朗乳膏 Ancinalon Cream (Ledercort)	每1gm含 Triamcinolone Acetonide Neomycin Sulfate	1mg 5mg	N016638329 N016638335 N016638372	10g 15g LB	皮膚炎、濕疹黴菌、搔癢病等。	塗擦少量於患處 每天3~4次。	處方
NO-04	膚生軟膏 Fusan Ointment (一支數效)	每1gm含 Nitrofurazone Chlorophyll Sulfadiazine	2mg 5mg 30mg	A023950329 A023950372	10g LB	火傷、燙傷、創傷、膿瘡及各種化膿性症、能促進傷口之肉芽生長、水泡糜爛、潰瘡等症。將患部洗淨後塗擦之。	每日2~3次。	處方
NE-07	克濕淨液 Kesezine Solution (清爽、不油膩、不用泡)	每100cc含 Undecylenic acid	10gm		100cc LB Gal 6Gal	香港腳、白癬各種皮膚黴菌感染等。局部噴擦。	每日早晚各二次。	指示
NO-06	克濕淨藥膏 Kesezine Ointment (台大)	每1gm含 Undecylenic acid Zinc undevylenate	5% 20%	N007484335 N007484338 N007484372	15g 20g Lb	香港腳、白癬各種皮膚黴菌感染。	每日擦1~2次。	指示



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NO-03	祛癢舒(敏能)軟膏 Chih-yeang-Shu (Minan) Ointment (殺菌、消炎、止癢持久— 次完成)	每1gm含 Prednisolone Chlorpheniramine Maleate Hexachlorophene Lidocaine	2.5mg 1.25mg 2mg 20mg	N040475329 N009203335 N009203338 N009203372	10g 15g 20g Lb	神經性皮膚炎、昆蟲刺傷、蕁麻疹、濕疹、過敏性皮膚炎、皮膚搔癢等。 擦於局部患處。	每日2~3次。	處方
NO-02	安寧軟膏 Aline Oint	Tretinoin	0.5mg		5gm 10gm 15g 20gm Lb	尋常性痤瘡、皮膚角質化。以棉花或指頭將安寧軟膏均勻塗於患部。每日使用之次數依皮膚反應而定。	通常一天一次至二次，至於皮膚較敏感者則可兩天一次，使用後請將手洗淨。	指示
NE-10	比碘藥水 P-Iodine Aqueous Sol	每1cc含 Povidone-Iodine (1% active I ₂)	100mg	A012961343 A012961351 A012961357 A012961372	120cc 450cc 100cc Gal 6Gal	消毒殺菌劑。	使用本劑不須稀釋，直接到適量本劑於患處即可。	指示
NO-07	皮佳治乳膏 Cream (本劑抗炎症比 Hydrocortisone 強 5000 倍) (軍公)	Propadam 每1gm含 Beclomethasone dipropionate	0.25mg	A026858321 A026858329 A026858335 A026858372	5g 10g 15g 450g	濕疹及皮膚炎，包括皮脂溢出性及日曬皮膚炎、牛皮癬、過敏性皮膚性、包括單純苔蘚、擦爛、盤狀紅斑性狼瘡。 本劑為水溶性軟膏，宜用於有滲出液或多毛的皮膚部位使用時將本劑塗整個患部，	開始時每天二次，但當有起色時，施藥的間隔可以延長，而最後可以停止用藥。如有復發，治療必須重新開始，每三天或四天使用一次，可以避免再復發。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法	用星	備註
NE-11	比碘擦洗液 P-I Surgical	每1cc含 Povidon Iodine	75mg	A012960343 A012960357	120cc 100cc Gal 6Gal	外科方面：手術前醫護人員及病患之清潔消毒。 婦科方面：產前產後預防感染，月經前後之局部清洗。	醫護人員之消毒；倒本5ml於手掌上，不須加水，刷洗5分鐘，再用清水沖洗。		指示
NO-08	皮克定軟膏 Tropodin Ointment (軍公)	每1gm含 Neomycin Sulfate Diphenylpyraline Hydrocortisone Buphenin Hcl	5mg 1mg 5mg 1mg	A023985329 A023985335 A023985372	10g 15g Lb	治療血管障礙，促進皮膚細胞新生，止癢、皮膚炎。	治療血管障礙，促進皮膚細胞新生，止癢、皮膚炎。塗敷患部，每日三至四次。		處方
NE-14	止癢懸浮液 Zuyan Susp.	每1cc含 Hexachlorophene Diphenhydramine HCL Calamine Ethyl Aminobenzoate	5mg 10mg 10mg 100mg	A023979399 A023979351 A023979357	60CC 120CC 450CC Gal 6Gal	皮膚炎、皮膚搔癢、皮膚過敏、痱子、濕疹。	臨用前充分搖動，將患部洗淨後，倒出適量於藥棉上塗擦於患部，每日數次。		指示
NO20	活動乳膏 Movement Cream	Diclofenac di-ethylammonium (相當於Diclofenac sodium 10毫克)	11.6mg		20gm LB	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	依據疼痛部位面積大小來決定本品用量,在作用部位輕輕擦入本品二到四克,每日三到四次.依病症與病患反應來		指示



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NE-01	黃藥水 Acrinol Solution	每1cc含 Acrinol	2mg		60cc Lb G 6G	外用殺菌、消毒。	適量塗抹患部，1日 1~2次，視患部輕重 而定。	指示
NE-09	雙氧水 Oxydol	每1cc含 Hydrogen Peroxide	30mg		LB Gal 6Gal	創傷面之殺菌消毒。	一般殺菌消毒適量塗 抹患部。	指示
NE-12	複方煤溜油酚溶液 Saponated Cresol Solution	每cc含 Cresol	0.5cc/cc	A033307372	450cc Gal 6Gal	一般外用消毒，皮膚、 污染、器具、傷口之消 毒，傳染病患者之排泄 物之消毒。	本品含Gresol 50%，一般消毒用稀 釋成1.0~3.0%，皮 膚患者浴洗用稀釋 0.1~1.0%。本藥須 經醫師指示使用。	指示
NE-02	煤溜油酚溶液 Cresol Solution 1.5%	每1cc含 Saponate Cresol Solution	0.03ml		LB Gal 6Gal	一般外用消毒、皮膚、 污物、器見、傷口之消 毒、傳染病患者之排泄 物之消毒。 創傷、黏膜等之防腐洗 滌用。	創傷、粘膜等防腐洗 滌用：將本品加水稀 釋至3~10倍，消毒 用則稀釋一倍後使 用。	指示
NO-21	疼可治膏 Teng Ko Zii ointment	每公克 冬綠油 薄荷腦 桉葉油 薰衣草油 樟腦	207.3mg 155.5mg 93.3mg 57.8mg 31.1mg		10gm 50gm LB	感冒頭痛,肚痛腹脹,中暑 暈眩,蚊蟲咬傷,舟車暈浪 風濕筋痛,止痛止癢,刀傷 創傷.	每人每天數次,每次適 當塗抹傷痛部位	成藥



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
KO-02	惠皮能乳膏 Sdermo Cream 1%	每gm含 Silver sulfadiazine	10mg		25gm 450gm	局部預防及治療 二級三級燒傷的 傷口化膿	適量約1-2mm厚塗抹患，以 維持不斷覆蓋傷口,1日1~2 次，視患部輕重而定，本藥 須經醫師指示使用。	處方
KE-01	專業髮則 Conazole Shampoo	每cc含 Ketoconazole	20mg		60c.c. 120c.c. 450c.c.	皮膚和毛髮的黴 菌感染	一天洗髮一次，連續五天,視 患部輕重而定。	指示
KO-01	痘化凝膠 Dufa Gel	每gm含 Benzyl peroxide	100mg		25gm 450gm	治療尋常性座瘡	使用初期一天一次,然後調整 為一天2-3次。	指示
HA-01	脫霖脫毛乳膏 Torin ointment	每gm含 Ca. thioglycolate	75mg		60gm 450gm	一般體毛(手腳 部)及較粗體毛 (如腋毛)之脫毛	先用清水洗膚,塗一層於脫毛 處,等待十分鐘,體毛會自然脫 落。	指示
KC-01	舒氣爽乳膏	天然多種漢方				主治脹氣 舒鼻 頭暈等	輕擦於不舒服處即可	化妝品

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NS-01	可靜糖衣錠 Choazin S.C. Tab. (Flagyl Tab.)	Metronidazole	250mg	N009208100	1000T	女性陰道滴蟲症、陰道炎、 男性滴蟲尿道炎。	每日2次，早晚各 1次，每次一片。	處方
JT-06	替爾淨錠 Tinizin Tablets (Fasigyn-500)	Tinidazole	500mg	A035151100	1000T	陰道滴蟲赤痢變形蟲及藍氏 賈第鞭毛蟲等引起之泌尿器 感染症。	每日三次，一次一 錠或每日二次，一 次一錠半。治療期 五天。	處方
NT-17	那利錠 Nalidin Tablets (Wintomton)	Nalidixic acid	500mg	A001398100	1000T	革蘭氏陰性菌之感染症急慢 性尿路感染症膽道感染症、 急慢性腸炎。	每4~6小時服用一 錠。	處方
NT-14	喉波平舌錠 Hovapin Troche Tab- lets (Hovapon)	Dequalinium CL	0.25mg	N007967100	(P)100T 1000T	急慢性咽喉炎、口舌炎、扁 桃腺炎、口腔殺菌。	每2~3小時含一 錠。	指示
LT-05	克治新腸溶錠 Chymotisin Tablets (Chymopsin E.C.T.)	Chmotrypsin	5mg	N004964100	1000T	手術及外傷後腫脹之緩解副 鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器 疾患隨伴咳痰、咳出困難、 氣管內麻醉後之咳痰、咳出 困難、痔核。	通常成人每次一 片，一日四次。	處方
NT-04	必治炎錠 Bi Aui An Tablets (Bactrin)	Sulfamethoxazole Trimethorprim	400mg 80mg	A024362100	1000T	由革蘭氏陽性菌、陰性菌所 引起之呼吸道、胃腸道及泌 尿道感染症。	每天服用2次，每 次2錠。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
JT-04	能酵錠 Lysozyme Tab (Lysozyma)	Lysozyme Cl	30mg	A035176100	100T 1000T	慢性副鼻腔炎、呼吸器疾患所伴隨之膿痰咳出困難症狀(齒科、泌尿器科領域)術中術後的出血。	一天三次一次一錠。	處方
JC-08	尿疾克膠囊 Uritec Capsules (Dolcol)	Pipemidic acid	250mg	A035155100	100C 1000C	由綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷氏桿菌、腸內桿菌、枸橼桿菌所引起腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎、內耳炎。	每日口服2~8粒，分3~4回服用。依症狀作適宜的增減。	處方
JC-04	保帶膠囊 Paurapol Capsules (Flagyl Cap)	Metronidazole	250mg	A035160100	100C 1000C	毛滴鞭毛蟲所引起之泌尿器感染症。	通常婦女一次一粒，一日三次，男人一次一粒，一日二次，繼續服用十天。	處方
JC-10	伊舒辛膠囊 Escin Capsules (Reparil)	Escin	20mg	A035157100	100C 1000C	治療中風、腦震盪及浮腫引起之發炎腫脹。	通常口服1天2次，1次1~2膠囊。	處方
NS-04	杏平腸溶錠 Hsingpin E.C. Tab.	Bromelain	50mg	N004843100	100T 1000T	手術及外傷後腫脹之緩解副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴咳痰、咳出困難、氣管內麻醉後之咳痰、咳出困難、痔核。	通常成人初服一次2錠一日服用四次。持續量一次錠一日服用3~4次。依年齡症狀適宜增減。	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NT-16	美宮錠 Mergon Tablets	Ergonovine Male-ate	0.2mg	N009702100	1000T	產假期出血，分娩時子宮弛緩出血、產後防止出血、子宮收縮不全。	每次1~2片，每日1~2次。	處方

M

NS-02	喜得健糖衣錠 Cedegen S.C. Tablets (含300mg強力Vitc及其他高單位維生素一日一粒就夠)	Ascorbic acid Calcium Pantothenate Cyanocobalamin Nicotinamide Pyridoxine HCl Riboflavin Thiamine Mononitrate	300mg 20mg 4mcg 100mg 2mg 10mg 10mg	A029614100	100T 1000T	維生素B.C缺乏症。	一日一次，一次一粒。	指示
NC-13	維他新多命膠囊 VitaSinatimin Capsules (Moriamins)	31種Vitamins及 Amino Acid		N011832100	100T 1000T	維他命缺乏症之預防及治療、營養補給、體力恢復、精神不振、過勞、倦怠、貧血、神經炎、火傷、病後促進復元、蕁麻疹、骨折治療、夜盲症等。	每日1~2次每次1~2片。	處方

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
NO-05	痔瘡藥膏 Hemorrhoid Ointment	每1gm含 Prednisolone Nitrofurazone Bismuth - subgallate Lidocaine Penylephrine HCL	2.5mg 2mg 50mg 20mg 2.5mg	N009215340	25g LB	急慢性內外痔瘡、痔出血、 肛門周圍之炎症、肛門潰瘍 及裂傷等。	每次擠入肛門約 2g，每日2~3次。	指示
JT-02	第卡舒錠 Demiso Tablets (Decaris)	Levamisole	150mg	A035158100	100T 1000T	蛔蟲、鈎蟲、糞圓蟲等驅蟲 劑。口內炎、口角糜爛、鵝 口瘡，增加身體產生免疫 力。用於預防感染症及控制 癌細胞之轉移。	成人一次一錠，口 服一次即可達驅蟲 效果 兒童 3mg/ kg。	處方
NT-23	信諾克錠 Sincox Tablets (Vermox)	Mebendazole	100mg	A020043100	(P)100T 1000T	蟯蟲、蛔蟲、鈎蟲、鞭蟲、 條蟲、糞圓蟲等蟲類所引起 之感染。	每次50~100mg早 晚各一次，連續治 療三天。	指示

編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
LT-17	普力能錠 Prenin Tablets	Prednisolone	5mg	N005854100	1000T	關節炎、皮膚炎、神經痛、氣喘。	初次 10~20mg 以後 每次 5mg 每日 1~2次。	處方
NT-03	貝他松錠 Betamethasone Tablets	Betamethasone	0.5mg	A011168100	1000T	關節炎、痲瘋熱、膠原病、過敏性疾患、關節周圍炎、痛風、重病皮膚症狀。	成人每次 1~3 片 每日 3~4 次。	處方
LT-06	特克通錠 Decoton Tablets (Decadron)	Dexamethasone	0.5mg	N004968100	1000T	多種過敏性疾患與炎症。	每次 0.5~1mg。	處方
JC-05	沙莫慕莉膠囊 Sabolin Capsules	Methyltestosterone Thiamine Propyl disulfide	10mg 5mg	A035150100	(P)100C 1000C	男性荷爾蒙分泌不足所致之症狀 男子更年期障礙 (精力減退、頭暈、目眩、耳鳴) 之緩解，抑制乳汁分泌。	成人一天服一至三粒。	處方
NC-05	福朗膠囊 Fuloan Capsules (Android-F)	Fluoxymesterone	10mg	A019518100	(P)100C 1000C	更年期障礙、精力減退、子宮出血、月經痛、乳汁分泌過多。	成人每天服 1-3 粒	處方
NT-26	脫濕風錠 Triamcinolone Tablets (Kenacort)	Triamcinolone	4mg	A020781100	1000T	類風濕性關節炎、支氣管氣喘、風濕熱、炎性皮膚炎濕疹、膠原病、炎症性眼疾病、結節性動脈周圍炎。	初劑量：每日 2~4 錠，分 3~4 次服用，得到良好效果後，則每 2~3 日減少 1/2 錠，直到減至最少量而能維持患者相當為止。	處方



編號	藥名	主成分	單位	健保代碼	包裝規格	適應症	用法、用量	備註
JS-01	寶樂能糖衣錠 Pophyrin S.C. Tab. (Prolmon)	Protoporphyrin Disodium	20mg	A035161100	100T 1000T	急慢性肝炎、膽 炎、肝變硬、膽石 症引起之肝機能障 礙，預防肝癌有 效。	通常成人每次1~2 錠，一日服用3 次，飯後服用。	處方
NS-09	增爾能糖衣錠 Zu A Nang S.C. Tab- lets (保肝錠)	DI-methonine Cholinebitartrate 及多種Vitamin等	100mg 100mg	A015675100	100T 1000T	維護肝臟正常功 能。 消除疲勞、增強體 力、營養補給。	每日三次，每次飯 時一同服食二粒。	指示



新喜國際企業股份有限公司

NEW CHEMICAL & PHARMACEUTICAL LABORATORY CO LTD



cGMP Western Medicine

cGMP 西藥廠

劑型包含

外用膏劑&液劑、口服錠劑、粉劑及液劑。

化妝品廠

合作開發

專業包裝

產品研發設計

成品協助外銷



Cosmetics



GMP Chinese herbal medicine

GMP 中藥廠

劑型13種

許可證60種以上

食品廠

(包含農產加工品)

合作開發

專業包裝

產品研發設計



Health food



Phone(電話) : +886-6-6550550-3

Fax (傳真) : +886-6-550552

E-mail: sales@minepharm.com

website: www.minepharm.com

台南縣鹽水鎮孫厝里4-6號 73744 4-6 , Shun-Tsu Li, Shun Tsu Liao, YenShai Chen, Tainan, Taiwan 73744